

Numeryczna algebra liniowa

Tzn.: układy równań liniowych cd, uwarunkowanie i normy macierzy, LZNK, numeryczne zadanie własne.

Zad 1 Dla której z macierzy A_k istnieje dolnotrójkątny czynnik rozkładu Choleskiego L_k z dodatnimi elementami na diagonalu (tzn: $A_k = L_k L_k^T$):

$$A_1 = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 4 \\ -1 & 12 & 5 \\ 3 & 5 & 10 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 7 \\ -1 & 3 & 5 & 3 \\ 2 & 5 & 10 & 0 \\ 7 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Podaj uzasadnienie nieistnienia czynnika Choleskiego lub **policz ten czynnik**.

Zad 2 Dla której z macierzy A_k istnieją czynniki rozkładu LU tzn dolnotrójkątna macierz L_k z jedynekami na diagonalu i U_k górnortrójkątna macierz z dodatnimi elementami na diagonalu takie, że $A_k = L_k U_k$:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 7 \\ -8 & -6 & 5 & 3 \\ 2 & 5 & 10 & 0 \\ 7 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 12 & 5 \\ 3 & 5 & 10 \end{pmatrix}.$$

Podaj uzasadnienie nieistnienia czynników rozkładu LU lub **policz te czynniki**.

Zad 3 Znajdź czynniki rozkładu LU macierzy A obliczne za pomocą eliminacji z częściowym wyborem elementu głównego (częściowe osiowanie) i rozwiąż układ $Ax = b$ z użyciem tego rozkładu dla:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -10 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix},$$

Zad 4 Znajdź oszacowania (postaci $O(n^p)$ dla $p = 0, 1, 2, 3$ z możliwie małym p niezależnym od Q) współczynnika uwarunkowania dla dowolnej macierzy ortogonalnej Q $n \times n$ (tzn. $Q^{-1} = Q^T$) w normach: drugiej, maximum i pierwszej. (indukowanych)

Zad 5 Niech $R_1 = (r_{ij})$ macierz górnortrójkątna $n \times n$ taka że $r_{ij} = 1$ $j \geq i$ czyli macierz górnortrójkątna ze wszystkimi elementami na diagonalu i nad-diagonalą równymi jeden, a $R_2 = R_1 - 2 * I$ też górnortrójkątna ale z jedynekami nad-diagonalą ale minus jeden na diagonalu. Policz współczynnik uwarunkowania R_k w normie pierwszej. Czy zależy od n ? A jeśli tak to jak?

Zad 6 W wyniku 1 kroku metody Householdera dla macierzy A otrzymano macierz postaci

$$H_1 * A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 5 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

dla H_1 macierzy Householdera z wektorem Householdera $w_1 = (1, 0, 1)^T$.

- Wyznacz wektor Householdera dla macierzy Householdera H_2 taki, że $H_2 H_1 A = R$ macierz górnotrójkątna.
- Policz 3-cią kolumnę macierzy A .
- Policz macierz R .
- Wyznacz drugą kolumnę macierzy A^{-1} korzystając z otrzymanego rozkładu QR macierzy A .

Zad 7 W wyniku 1 kroku metody Householdera dla macierzy A otrzymano macierz postaci

$$H_1 * A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$$

dla H_1 macierzy Householdera z wektorem Householdera $w_1 = (1, 0, 0, 1)^T$.

- określ czy A jest kolumnami regularna
- Wykonaj kolejny krok metody Householdera tzn. policz macierz R prostokątna górnotrójkątna z głównym minorem nieosobliwym i wyznacz wektor Householdera dla macierzy Householdera H_2 takie, że $H_2 H_1 A = R$.
- Policz 2-gą kolumnę macierzy A .
- Rozwiąż LZNK z macierzą A i wektorem.

$$b = \begin{pmatrix} -8 \\ -6 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix},$$

Zad 8 Rozpatrzmy macierz zapisaną w formie blokowej $A = \begin{pmatrix} H & \vec{b} \\ \vec{b}^T & a \end{pmatrix}$, gdzie H macierz Householdera $m \times m$ dla danego wektora Householdera $\vec{x} \neq 0$ (zakładamy że H nie jest utworzona - znamy tylko wektor Householdera), \vec{b} wektor wymiaru m i a skalar.

- Zaproponuj algorytm rozwiązania układu równań liniowych $Ay = f$ możliwie niskim kosztem przy założeniu, że A nieosobliwa. Oszacuj ten koszt w terminach $O(n^p)$ dla $p = 1, 2, 3, \dots$

- (b) Podaj możliwy do sprawdzenia warunek na a , aby A była nieosobliwa (dla zadanych \vec{b} i \vec{x})

Zad 9 Dla danych m różnych punktów (x_k, y_k) określamy krzywą $y - a * x^2 - b = 0$ (a, b , parametry krzywej) jako najlepiej pasującą do tych punktów jeśli:

$$\sum_{k=1}^m |y_k - a * x_k^2 - b|^2 = \min_{c,d} \sum_{k=1}^m |y_k - c * x_k^2 - d|^2$$

Sformułuj zadanie znalezienia parametrów takiej krzywej jako liniowe zadanie najmniejszych kwadratów (LZNK) dla danych m punktów. Określ jakie warunki muszą spełniać punkty aby to zadania miało jednoznaczne rozwiązanie dla $m \geq 0$. Wyznacz koszt rozwiązania tego LZNK zadania przy pomocy algorytmu Householdera względem m tzn. jako $C_H m^p + O(m^{p-1})$ dla C_H stałej dodatniej i p wykładnika naturalnego.

Zad 10 Dla macierzy

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 1 \\ 1 & 10 \end{pmatrix}$$

- (a) znajdź wektory i wartości własne (wektory o normie drugiej jeden),
(b) czy ciąg wektorów (o normie drugiej jeden) generowany przez metodę potęgową zbiegnie dla $x_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} * (1, 1)^T$ - ewentualnie czy istnieje podciąg zbieżny w tym ciągu? Jeśli tak, to policz odpowiednie granice.
(c) określ czy ciąg iteracji parzystych x_{2k} (o unormowanych w normie drugiej) dla metody odwrotnej potęgowej z parametrami $a_1 = 0$ i $a_2 = 10$ zbiegnie dla $x_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} * (1, 1)^T$. Określ granice ilorazów Reynoldsa dla $\{x_k\}_k$ i wyjściowej macierzy A o ile zachodzi zbieżność.

Zad 11 Wykonaj jeden krok czystej metody QR dla zadania własnego dla macierzy z zadania 10. Określ czy ciąg macierzy generowanych czystą metodą QR zbiegnie do macierzy diagonalnej - jeśli tak to określ elementy diagonalnej tej macierzy (kolejność nieważna).