

Stała Eulera - Mascheroniego

Leonhard Euler (ur. 1707 w Bazylei, zmarł 1783 w Petersburgu) szwajcarski matematyk, jeden z największych matematyków w historii. Uczeń Jana Bernoulliego, studiował w Bazylei; po śmierci Mikołaja Bernoulliego (syna Jana) objął po nim w 1727 roku pozycję w Petersburgu. Tam współpracował m.in. z kolejnym synem Jana, Danielem Bernoullim, Christianem Goldbachem i Jakubem Hermannem. W 1741 roku przeniósł się, na zaproszenie Fryderyka II, do Berlina, by w 1766 roku wrócić do Petersburga. Miej więcej w tym samym czasie stracił wzrok, od tego swoje dzieła dyktował. Wniesień ogromnych wkład we wszystkie istniejące wówczas dziedziny matematyki, w tym w teorii liczb, teorii szeregów, (i inne działy analizy matematycznej), analizie zespolonej, teorii funkcji specjalnych, kartografii, równaniach różniczkowych, rachunku różnicowym, geometrii różniczkowej, mechanice ciągłej i hydrodynamice, astronomii, optice, teorii muryli, teorii grafów... Jego „Opera Omnia”, od ponad 100 lat komplebowane przez Szwajcarską Akademię Nauk, licząc na razie 72 tomy, & wciąż publikowane są (i przygotowywane do publikacji) listy Eulera – kolejne kilkaset mniej więcej tomów. W sumie Euler opublikował ok. 900 prac, w tym 40 ksiązek. Zmarł na wylew w 1783 roku; żona Katarzyna Gsell miała 13 dzieci, z czego 5 dożyło dojrzałości wieku.

Lorenzo Mascheroni (1750, Bergamo – 1800, Paryż) wioskii lesiędu i matematyki, początkowo uczył matematyki i fizyki w seminarium duchownym w Bergamo, potem objął katedrę algebra i geometrii w Pawi; od 1789 do 1793 był rektorem tego uniwersytetu. Miał istotny wkład w rozwój statystyki, ale w matematyce pamięta się ze względu na 2 wyniki:

- dowód, że każdą konstrukcję, której można wykonać przy pomocy cyrkuła i linijki, można również wykonać przy pomocy samego cyrkuła

Oznaczało to, że przy pomocy cyrkuła można rysować odcinki. Twierdzenie mówi, że każdy punkt, który można wyznaczyć

klasyczną konstrukcją (cyrkiel + linijka)

może być wyznaczony z wykorzystaniem tylko cyrkułu.

(ten sam wynik, zupełnie innymi metodami, uzyskał 125 lat wcześniej duński matematyk Georg Mohr, jego praca popadła jednak w zapomnienie).

- obliczenie stałej znanej dziś jako stała Eulera - Mascheroniego z dokładnością do 32 miejsc po przecinku.

W niewierności Mascheroni pomylił

się przy 20 miejscu i dalsze cyfry wyznaczyły błędnie.

Zmarł w 1800 roku w Paryżu.

Przyjmyjmy się do tego

$$\alpha_n = \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}}{\ln n}$$

Mianownik idzie do $+\infty$ gdy $n \rightarrow \infty$, mamy więc do obliczenia $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n$ użyć lematu Stolza:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n &\stackrel{s}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right)}{\ln(n+1) - \ln n} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\underbrace{\ln\left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}\right]}_{\downarrow n \rightarrow \infty}} = 1.\end{aligned}$$

Stąd, dla dużych n , $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \approx \ln n$.

Ale jak dobrze jest to przybliżenie? Czy błęd rośnie, czy maleje gdy $n \rightarrow \infty$? Co wiemy o $1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n$?

Oznaczmy $\alpha_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n$.

$$\begin{aligned}\alpha_{n+1} - \alpha_n &= 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) - \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right) + \ln n = \\ &= \frac{1}{n+1} + \ln \frac{n}{n+1} = \frac{1}{n+1} + \ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \stackrel{\uparrow}{\leq} \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+1} = 0\end{aligned}$$

bo $\ln(1+t) \leq t$ dla $t > -1$

Stąd $\alpha_{n+1} \leq \alpha_n$ i ciąg (α_n) jest malejący.

A teraz wzmaczny ciąg

$$\beta_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n-1} - \ln n = \alpha_n - \frac{1}{n} \quad (\text{dla } n \geq 2)$$

$$\begin{aligned}\beta_{n+1} - \beta_n &= \alpha_{n+1} - \alpha_n - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n} = \frac{1}{n+1} + \ln \frac{n}{n+1} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n} = \\ &= \frac{1}{n} - \ln \frac{n+1}{n} = \frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \stackrel{!}{\geq} \frac{1}{n} - \frac{1}{n} = 0\end{aligned}$$

jak poprzednio, $\ln(1+t) \leq t$ dla $t > -1$

Tak więc (β_n) jest nonalejający. Oznaczenie

γ

$$\beta_1 \leq \beta_2 \leq \dots \leq \beta_n \quad \Leftarrow \quad \alpha_1 \leq \alpha_{n-1} \leq \dots \leq \alpha_2 \leq \alpha_1$$

wiąże (β_n) jest ograniczony z góry (\Rightarrow zbieżny) a (α_n) – z dołu. Widzimy też, że

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\alpha_n - \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n$$

Oznaczymy tą wspólną granicę (α_n) i (β_n) przez γ .

$$\forall_{n \in \mathbb{N}} \quad \beta_n \leq \gamma \leq \alpha_n.$$

$$\beta_4 \approx 0,447 \leq \gamma \leq \alpha_4 \approx 0,697$$

$$\beta_{10} \approx 0,5264 \leq \gamma \leq \alpha_{10} \approx 0,6264$$

:

$\gamma \approx 0,57721566\dots$ stała Eulera-Mascheroniego, pojawia się w różnych dzinnych miejscach w teorii liczb, teorii funkcji specjalnych, kwantowej teorii pola...

Nie wiadomo, czy γ jest liczbą wymierną!

Przykład zastosowania:

Oblicz $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \cdot \frac{1}{k}$ lim $\left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{n} \right)$

$$a_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{\lceil \frac{n}{2} \rceil} \right)$$
$$= 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{\lceil \frac{n}{2} \rceil} \right)$$

$$= 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n - \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{\lceil \frac{n}{2} \rceil} - \ln \lceil \frac{n}{2} \rceil \right)$$

$$+ \ln n - \ln \lceil \frac{n}{2} \rceil = \alpha_n - \alpha_{\lceil \frac{n}{2} \rceil} + \ln \frac{n}{\lceil \frac{n}{2} \rceil}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_n \rightarrow \gamma, \text{ więc } \alpha_{\lceil \frac{n}{2} \rceil} \rightarrow \gamma, \quad \frac{n}{\lceil \frac{n}{2} \rceil} = \begin{cases} 2 & n \text{ parzyste} \\ \frac{n}{\frac{n-1}{2}} = 2 \frac{n}{n-1} & n \text{ nieparzyste.} \end{cases} \\ \text{gdz } n \text{ nieparzyste.} \end{array} \right.$$

$$\text{stąd } \frac{n}{\lceil \frac{n}{2} \rceil} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 2$$

$$\ln \frac{n}{\lceil \frac{n}{2} \rceil} \rightarrow \ln 2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \gamma - \gamma + \ln 2 = \ln 2$$

Wróćmy jeszcze do lematu Stolza.

Pryjmy się ciągowi $a_n = \frac{n^2 + (-1)^n \cdot n}{n^2}$.

Oczywiście $a_n = 1 + (-1)^n \cdot \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$; gdy jedna zapisujemy a_n w pierwnej z postaci, tj. $\frac{n^2 + (-1)^n n}{n^2}$, mówimy, że mianownik obiega do ∞ . Możemy zatem, obliczając $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, skorzystać z lematu Stolza.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + (-1)^n n}{n^2} \stackrel{\mathbb{S}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2 + (-1)^{n+1} (n+1) - n^2 - (-1)^n n}{(n+1)^2 - n^2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2 + (-1)^{n+1} (n+1) - n^2 - (-1)^n n}{(n+1)^2 - n^2} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1 + (-1)^{n+1} (2n+1)}{2n+1} \underset{\mathcal{Z}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} [1 + (-1)^{n+1}]$$

Ta ostatnia granica nie istnieje!

Nie można z tego wynieść, że nie istnieje $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$! (bo wiemy, że istnieje).