

# Klasówka poprawkowa, matematyka A, 8 grudnia 2006

Na rozwiązanie wszystkich zadań jest 90 minut

Rozwiązania różnych zadań mają znaleźć się na różnych kartkach.

Każda kartka musi być podpisana w LEWYM GÓRNYM ROGU nazwiskiem i imieniem piszącego, jego nr. indeksu oraz nazwiskiem osoby prowadzącej ćwiczenia i nr. grupy ćwiczeniowej.

**Nie wolno korzystać z kalkulatorów, telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych; jeśli ktoś ma, muszą być schowane i wyłączone!**

*Nie wolno korzystać z tablic ani notatek!*

Wszystkie stwierdzenia należy uzasadniać. Wolno i NALEŻY powoływać się na twierdzenia, które zostały udowodnione na wykładzie lub na ćwiczeniach.

**Wynik np. w postaci  $\sqrt{88510464+194^2}$  jest równie dobry, jak w postaci 9410**

- (1.1) Zdefiniować  $\log_d c$  pamiętając o założeniach o  $c$  i  $d$ .  
(1.2) Rozwiązać równanie:  $\log_{10} \frac{x+5}{3} + \log_{10} \frac{x-2}{3} + \log_{10} \frac{x-3}{2} = \log_{10}(\log_2 3 \cdot \log_3 2)$ .  
(1.3) Wykazać, że  $3 \log_{10} 7 < 1 + 2 \log_{10} 6 < 2 \log_{10} 19$ .
- Rozwiązać równanie:  $\log_2 [\sin(\varphi + \frac{\pi}{4})] = -\frac{1}{2}$ .  
Zilustrować rozwiązanie tego równania na okręgu  $x^2 + y^2 = 1$ .
- Podać definicję kosinusa dowolnego kąta dodatniego. Rozwiązać nierówność:  $|\cos t| < \frac{1}{2}$ .  
Zilustrować rozwiązanie tej nierówności na okręgu  $x^2 + y^2 = 1$ .
- Niech  $A = (1, 2)$ ,  $B = (5, 4)$ ,  $C = (3, 8)$ . Znaleźć środek okręgu opisanego na trójkącie  $ABC$  i pole tego trójkąta. Wyjaśnić, czy trójkąt jest ostrokątny, prostokątny czy rozwartokątny.

5. Obliczyć  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 & -3 \\ 2 & 2 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$  i  $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 & -3 \\ 2 & 2 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

Obliczyć wyznaczniki  $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & 8 \\ -1 & 3 & 9 \end{vmatrix}$  i  $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$ .

6. (6.1) Niech  $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$  i  $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ . Znaleźć współrzędne wektora  $\vec{w} := -\frac{1}{4}\vec{u} \times \vec{v}$ .

Znaleźć długości  $\|\vec{u}\|$  i  $\|\vec{v}\|$  wektorów  $\vec{u}$  i  $\vec{v}$ .

- (6.2) Znaleźć kosinusy obu kątów, które tworzą płaszczyzny o równaniach:

$$x + 2y + 3z = 0 \quad \text{i} \quad 3x + 2y + z = 0.$$

- (6.3) Niech  $A = (1, -2, 1)$ ,  $B = A + \vec{u} \times \vec{w}$ ,  $C = A + \vec{u} \times \vec{w} + \vec{v} \times \vec{w}$ ,  $D = A + \vec{v} \times \vec{w}$ .

Znaleźć pole czworokąta  $ABCD$  i jego środek symetrii, jeśli ten czworokąt jest środkowosymetryczny.

- (6.4) Znaleźć punkt symetryczny do punktu  $E = (3, 0, 4)$  względem płaszczyzny

$$x + 2y + 3z = 0.$$

**inf.** Informacje przeróżne (przydatne albo i nie):

$$\sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}; \quad \sin \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}; \quad \cos \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad 14^2 = 196, \quad 15^2 = 225, \quad 16^2 = 256, \quad 17^2 = 289, \\ 2^7 = 128, \quad 2^{10} = 1024, \quad 2^{12} = 4096, \quad 2^{20} = 1048576, \quad 3^4 = 81, \quad 3^8 = 6561, \quad 3^{13} = 1594323.$$