## 2.2 Przestrzeń ilorazowa i $L^\infty(\Omega,\mu)$

The Quotient space and q.s.

Liniowa q.s.

Przestrzeń liniowa ilorazowa $X/Y$ dla przestrzeni liniowej $X$ oraz $Y \subseteq X$ została przypomniana na str. PB-4.

for linear space

was recalled at

Teraz spróbujemy ją unormować zakładając, że $(X, \|\|)$ jest unormowana.

Now we try to norm it assuming that $(X, \|\|)$ is norm sp.

But sometimes it is not possible, however it always is possible, half possible, define for

Powiemy wtedy, że uda się „dość połowicznie", określimy dla $[x] \in X/Y$

$$\|[x]\| := \operatorname{dist}(x, Y). \tag{2}$$

Observe that properly define function

Zauważmy, że (2) określa poprawnie funkcję

$$\|\| : X/Y \longrightarrow \mathbb{R},$$

because when $x \equiv x'$ (tzn. $x - x' \in Y$) then $x' = x + y_0$, where $y_0 \in Y$

bo gdy $\operatorname{dist}(x', Y) = \inf_{y \in Y} \|x + (y - y_0)\| = \inf_{y \in Y} \|x - y\|$ (because $\{y - y_0 : y \in Y\} = Y$), i.e. tzn. prawa strona (2) nie zależy od wyboru reprezentanta klasy $[x]$.

right side of does not depend of member of

**Twierdzenie** („O przestrzeni ilorazowej")

On quotient space

1. $\|\|$ jest półnormą w $X/Y$.

is seminorm on

2. $\|\|$ jest normą w $X/Y$ wtw $Y = \overline{Y}$.

is iff

Jeśli ponadto $Y$ – domknięta oraz $\|\| := \|\|$ to:

If moreover is closed and then

3. $\Pi(K_X(x_0, r)) = K_{X/Y}([x_0], r)$ dla dowolnego $x_0 \in X$ oraz $r > 0$ / w szczególności $\Pi : X \longrightarrow X/Y$ *)

for any and In particular

jest przekształceniem liniowym ciągłym, otwartym, gdzie $\Pi$ zadane jest wzorem $\Pi(x) := [x]$, $x \in X$.

is continuous lin. map open, where $\Pi$ is given by

*) $X/Y$ tzn. $(X/Y, \|\|_i)$.



4. Jeśli $X$ jest przestrzenią Banacha, to także $(X/Y, \|\|_i)$ jest przestrzenią Banacha.

If is B. space, then also is

**Dowód**

Let

1. Niech $x_1, x_2 \in X$ i niech $\varepsilon > 0$. Dobierzmy $y_1, y_2 \in Y$ tak, że $\|x_j - y_j\| < \underbrace{\operatorname{dist}(x_j, Y)}_{= \|[x_j]\|} + \varepsilon/2$ dla $j = 1, 2$.

Mamy zatem:

$$\|[x_1 + x_2]\| = \operatorname{dist}(x_1 + x_2, Y) \leq \|(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2)\| \leq \|x_1 - y_1\| + \|x_2 - y_2\|$$
$$< \|[x_1]\| + \|[x_2]\| + \varepsilon,$$

co dzięki dowolności $\varepsilon > 0$ daje nierówność trójkąta dla $\|\|$.

Drugi warunek („jednorodność z modułem") dowodzi się dla $\|\|$ jeszcze łatwiej $\longrightarrow$ ∎.

2. Mamy $\|[x]\| = 0 \iff \operatorname{dist}(x, Y) = 0 \iff x \in \overline{Y}$, ale $[x] = 0 \iff x \in Y$. Stąd $\|\|$ ($(i \geq 1)$) jest normą wtw $Y = \overline{Y}$.

Dla dowodu części „ponadto" zakładamy, że $Y = \overline{Y}$, zatem dzięki 2. $\|\|_i$ jest normą w $X/Y$.

3. Zauważmy najpierw, że $\Pi(K_X(0, r)) \subset K_{X/Y}(0, r)$, gdyż

$$\forall_{x \in X} \quad \|\Pi(x)\|_i = \|[x]\| = \operatorname{dist}(x, Y) \leq \|x - 0\| = \|x\|. \tag{3}$$

Wykażemy, że jest „$=$" w powyższym „$\subset$".