

„Kolokwium” domowe

Poniżej znajduje się lista siedmiu zadań, których rozwiązania proszę dostarczyć mi na kartkach do 26.10.07. W razie wątpliwości lub problemów zapraszam na konsultacje do pokoju 4500 (których oficjalny termin to wtorki o 12, ale można próbować umówić się na inny termin).

Szymon Toruńczyk

Zadania

Ewoluta krzywej Niech $\gamma(t)$ będzie parametryzacją łukową krzywej gładkiej $\Gamma \subseteq \mathbb{R}^n$, $p = \gamma(t_0)$ punktem leżącym na krzywej Γ oraz ξ parametryzacją łukową pewnego okręgu, spełniającą własności:

- $\gamma(t_0) = \xi(t_0)$
- $\gamma'(t_0) = \xi'(t_0)$
- $\gamma''(t_0) = \xi''(t_0)$

Okrąg parametryzowany przez ξ nazywa się okręgiem ściśle stycznym do Γ w punkcie p . Jest on dobrze określony o ile $\gamma''(t_0) \neq 0$.

Ewolutą krzywej (niekoniecznie płaskiej) Γ o nieznikającej krzywiznie jest krzywa składająca się ze środków okręgów ściśle stycznych do krzywej γ .

Zadanie 1. Niech $\gamma(t)$ będzie dowolną regularną parametryzacją krzywej Γ . Wykaż, że jej ewoluta jest krzywą o parametryzacji

$$\varepsilon(t) = \gamma(t) + \frac{1}{\kappa(t)}N(t)$$

gdzie $N(t)$ jest wektorem normalnym (tzn. $N(t) = \gamma''(t)/\|\gamma''(t)\|$).

Uwaga. $\kappa(t)$ to krzywizna krzywej Γ w punkcie $\gamma(t)$. Podobnie $N(t)$ to wektor normalny w punkcie $\gamma(t)$.

Zadanie 2. Znajdź krzywiznę i ewolutę elipsy $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Zadanie 3. Znajdź krzywiznę i ewolutę spirali zadanej we współrzędnych biegunowych wzorem $r(\theta) = a^\theta$ dla danej stałej $a > 0$. Pokaż, że istnieje taka wartość parametru a , że krzywa ta jest swoją ewolutą.

Wzory Freneta Niech $\gamma(t)$ będzie parametryzacją łukową krzywej gładkiej w \mathbb{R}^3 , o nieznikającej krzywiznie. Definiujemy wektory:

styczny $T = \gamma'$

normalny $N = \gamma''/\|\gamma''\|$

binormalny $B = T \times N$.

Wektory T, N, B tworzą bazę ortonormalną, zwaną *trójnogiem Freneta*.

Twierdzenie 1. (Wzory Freneta) Pochodne wektorów T, N, B wyrażają się w bazie Freneta wzorami:

$$\begin{aligned}T' &= \kappa N \\N' &= -\kappa T + \tau B \\B' &= -\tau N\end{aligned}$$

dla pewnych funkcji κ, τ zwanych krzywizną oraz torsją (ładniejsza forma wzorów Freneta była podana na wykładzie).

Zadanie 4. Niech $\beta(s) = (\frac{(1+s)^{3/2}}{3}, \frac{(1-s)^{3/2}}{3}, \frac{s}{\sqrt{2}})$ dla $-1 < s < 1$. Oblicz współrzędne wektorów N oraz B oraz pokaż, że $\kappa = \tau$.

Zadanie 5. Policz współrzędne wektora binormalnego oraz torsję krzywej zadanej przez parametryzację

$$(\sin(t), \cosh(t), \cos(t))$$

(\cosh to kosinus hiperboliczny).

Zadanie 6. a) Pokaż, że jeśli $\kappa > 0$ oraz $\tau = 0$ to krzywa jest płaska, czyli zawiera się w pewnej płaszczyźnie.

b) Pokaż, że jeżeli dodatkowo $\kappa = \text{const}$ to krzywa jest łukiem okręgu. (Wskazówka: można skorzystać z zadania rozwiązanego na ćwiczeniach dla krzywych płaskich lub z twierdzenia mówiącego o tym, że krzywa jest zadana jednoznacznie z dokładnością do ruchu sztywnego przez funkcje krzywizny oraz torsji).

Zadanie 7. Policz krzywiznę i torsję krzywej Vivianiego, powstałej przez przecięcie sfery $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ z cylindrem $(x - a)^2 + y^2 = a^2$. (Wskazówka: $x = a \cos t + a, y = a \sin t$ parametryzują cylinder. Z równania sfery wylicz współrzędną z .)